

DEPOTNÍ SUBSTITUČNÍ PŘÍPRAVEK

BUVIDAL

Základní informace

Buvidal® - týdenní a měsíční forma přípravku

- **Indikace – středně těžká/těžká závislost na opioidech, +16 let**
- **Injekční roztok s prodlouženým uvolňováním aplikován do podkožní tkáně**
- **Vhodná místa k aplikaci – ramena, hýždě, břicho, stehna**
- **Zahájení léčby – při známkách abstinčního syndromu**
- **Podávání – vyhrazeno zdravotnickému personálu**

Zahraniční výzkumy

- První dvojitě zaslepená, randomizovaná klinická studie porovnávající týdenní a měsíční depotní formulaci subkutánního buprenorfinu se současnou dávkou sublingválního buprenorfinu-naloxonu prokázala depotní formulaci buprenorfinu jako účinnou alternativu pro léčbu závislosti na opioidech (Loftwall et al., 2018)

Diskuse

Je depotní buprenorfin alternativa substituční léčby adiktologických klientů v České republice?

Výzkum Analýzy potřeb - v současnosti realizuji výzkum mezi lékaři - psychiatry na téma substitučního přípravku Buvidal také v českém prostředí. Zde se zaměřuji na otázky potřebnosti, možnosti využití a překážek používání přípravku Buvidal v českých podmínkách. Cílem práce je informovat o přípravku Buvidal a podpořit debatu o depotním buprenorfinu v ČR jakožto další alternativy pro léčbu závislosti na opioidech.

Léčba závislosti na opioidech v zahraničí

- Schválen v roce 2017
- Spojené království, USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Evropa, některé země v Africe a na Blízkém východě
- Ve Finsku lék 1. volby pro substituční léčbu poruchy užívání opioidů
- Vhodný pro specifické skupiny populací

Výhody

- Využití pro regiony s nižší dostupností péče
- Využití pro specifické populace
- Pohodlí a kvalita života
- Nižší administrativní zátěž
- Nižší personální zátěž
- Nižší pravděpodobnost zneužití

Nevýhody

- Vyšší cena
- Vedlejší účinky u některých osob
- Potřeba individualizované péče
- Interakce s léky

- Výrazná heterogenita zkušeností klientů zejména v počáteční fázi léčby depotním přípravkem Buvidal (Neale et al., 2023)
- Klíčová témata, která ovlivňují setrvání klienta v léčbě depotním buprenorfinem jsou: otevřená komunikace mezi zdravotníkem a klientem o účincích depotního buprenorfinu, autonomie klienta v rozhodování o léčbě, informovanost o možných nežádoucích účincích, důraz na individuální potřeby klienta a odpovídající psychosociální intervence (Clay et al., 2023)